

第46届东盟峰会在马来西亚开幕

新华社吉隆坡5月26日电(记者 谢栋风 吴夏)第46届东盟峰会26日在马来西亚首都吉隆坡开幕。今年峰会的主题为“包容性和可持续性”，将聚焦加强区域一体化和提升抵御贸易风险的能力。

东盟轮值主席国马来西亚总理安瓦尔在开幕致辞中说，东盟的和平、稳定与繁荣取决于开放、

包容、有章可循的国际秩序，以及贸易、资本和人员的自由流动。

他强调，东盟必须维护多边体系，以经受住不确定性带来的挑战，为地区和人民创造“更加包容和可持续的未来”。

本次峰会在美国近来对多国频繁挥舞关税“大棒”，引发全球贸易秩序紊乱，严重破坏多边贸

易体制的背景下举行。

峰会将通过《东盟共同体愿景2045》并发表“吉隆坡宣言”，为东盟未来20年发展提供指导性意见和规划。

东盟成立于1967年，现成员国包括印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾、文莱、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨和缅甸10国。

以军轰炸加沙北部 造成至少49人死亡

新华社加沙5月26日电(记者 黄泽民)据巴勒斯坦通讯社26日报道，以色列军队当天轰炸加沙地带北部两地，造成至少49名巴勒斯坦人死亡。

报道说，以军轰炸了加沙城一所容纳流离失所者的学校，造成至少30人死亡、数十人受伤。以军还轰炸了杰巴利耶地区一栋房屋，造成至少19人死亡，遇难者中包括妇女和儿童。

以色列国防军26日发表声明说，在25日夜间至26日凌晨，以军打击了加沙城所在地区一所学校里的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织(杰哈德)的指挥控制中心。

此外，红十字国际委员会25日在社交媒体平台X上发表声明说，该组织两名工作人员24日在加沙地带南部汗尤尼斯的家中遭以军袭击身亡。

以军尚未对此发表回应。以军26日发表另一份声明称，过去48小时里，以空军打击了加沙地带200多个目标。

根据加沙地带卫生部门25日发布的数据，自3月18日以来，以色列方面对加沙地带多地发动袭击，已造成至少3785人死亡、10756人受伤。

李在明说 将推进恢复朝韩军事热线

新华社首尔5月26日电(记者 陆睿 黄昕欣)韩国共同民主党总统候选人李在明26日表示，将推进恢复韩国与朝鲜军事热线等韩朝沟通渠道，互相停止诱发紧张的行为，推进互惠的南北对话和交流合作。

李在明当天在社交媒体上发表自己的外交安保政策时说，将追求朝鲜半岛局势缓和与无核和平。对朝政策不能成为政治工具，应该只着眼于朝鲜半岛的和平与统一。

李在明表示，中国是韩国重要的贸易伙伴和对朝鲜半岛安全产生影响的国家，将稳定地处理韩中关系。

韩国第21届总统选举定于6月3日举行。本月10日，李在明正式登记成为总统选举候选人。

英国将西南铁路公司 收归国有

新华社伦敦5月26日电(记者 赵小娜)英国政府25日正式将西南铁路公司收归国有，标志着工党政府铁路改革迈出关键一步，也开启了英国铁路“去私有化”的新阶段。

西南铁路公司是英国主要的区域铁路运营商之一，负责运营伦敦至英格兰南部多个重要城市和城镇的线路，包括雷丁、朴茨茅斯、伯恩茅斯和埃克塞特等。

英国交通大臣海迪·亚历山大当天在伦敦滑铁卢车站出席首班国营列车发车仪式时说，此举是英国铁路“走出30年运营分散、效率低下和乘客失望局面”的转折点。

按照政府计划，目前与交通部签约运营的铁路服务将于2027年年底全部回归国有，由未来将设立的大不列颠铁路公司统一管理列车运营与铁路基础设施。

中柬“金龙-2025”联演 举行海空方向实兵演练

新华社柬埔寨西哈努克城5月26日电(段江山 甘俊)当地时间5月26日，中柬“金龙-2025”联演海空方向实兵演练在柬埔寨西哈努克港附近海空域举行，两国海军11艘舰艇、空军3架直升机组成联合任务编队，共同参加演练。

演练以“恐怖分子”驾驶武装快艇劫持货船为背景，聚焦海上联合反恐反劫持行动，重点演练联合响应、伴随护航、反恐反海盗、海空联合搜救等内容。联合任务编队收到情况通报后，紧急赶赴“事发海

域”进行处置。海上搜索发现目标后，海空力量综合运用喊话劝降、警告射击、拦截射击等多种手段，慑压逼停“恐怖分子”，并迅速实施封控警戒和登临拿捕。

随后，双方共同举行海空方向实兵演练结束仪式。此次演练，是中柬“金龙”系列联演首次海空联合实兵演练，是首次依托中柬云壤港联合保障和训练中心组织实兵演练，达到了相互学习借鉴、共同进步提高的目的，展示了双方共同维护海上安全的坚定意志和过硬能力。



研究揭示多不饱和脂肪酸 调节神经细胞功能机制

新华社东京5月26日电(记者 钱铮)日本一个研究团队通过分析由人诱导多能干细胞(iPS细胞)培养得到的神经细胞发现，细胞膜中多不饱和脂肪酸的含量及其构成比例变化会对神经细胞功能产生重要影响。相关论文发表在细胞出版社旗下《交叉科学》杂志上。

神经细胞的细胞膜主要成分是脂质和蛋白质，其中脂质包括二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)等多不饱和脂肪酸，此前已知它们对脑功能产生重要影响。

据日本理化学研究所、京都大学等机构日前联合发布的新闻公报，研究团队首先在不添加多不饱和脂肪酸的培养基中，利用来自健康人的iPS细胞培养出神经细胞，再向培养基中添加DHA和ARA。结果发现，随着多不饱和脂肪酸在细胞膜中含量增加，细胞膜的膜流动性提高。膜流动性表现为膜结构中的脂质和蛋白质分子的多种运动形式，包括侧向扩散、翻转运动等。在膜流动性升高情况下，脑部β淀粉样蛋白产生量会减少。β淀粉样蛋白异常沉积是阿尔茨海默

病和帕金森病等神经退行性疾病的主要病理特征之一。

随后，研究人员利用添加有多不饱和脂肪酸但DHA和ARA含量很少的培养基培养神经细胞，然后再向培养基中添加DHA和ARA。此次研究人员未发现细胞膜的膜流动性变化，但观察到神经细胞的突触尺寸变大，轴突变长，轴突分支也变得更多，形成更复杂的形态。研究团队推测，这或许表明添加的DHA和ARA令神经细胞之间的连接发生变化。

研究人员测定发现，在上述两种实验条件下，神经细胞活动的同步性都随着培养时间增加而增强。在培养基中添加多不饱和脂肪酸培养得到的神经细胞中，这种同步性更强。

研究成果表明，在用人iPS细胞培养得到的神经细胞中，细胞膜中的多不饱和脂肪酸的含量以及各种多不饱和脂肪酸的构成比例对神经细胞的功能发挥着重要作用。新发现有助构建与脂质相关的多种脑部疾病模型，并研究相关疗法。